


## Мозазавр

**Мозазавр** всегда занимал особое место в истории древнейших ископаемых животных. Морской ящер относился к последним представителям хищных морских пресмыкающихся. Он появился в самом начале мелового периода, придя на смену ихтиозавру.



Во времена позднего мела мозазавр стал одним из крупнейших морских животных из отряда динозавров – максимальная длина тела морского ящера доходила до 10 метров.

Впервые останки древней рептилии обнаружены в 1776 году в Голландии: в одном из карьеров был найден череп, принадлежащий грозному морскому хищнику. В отличие от других морских динозавров, он имел тех же предков, что и современные вараны. Вытянутое тело ящера было покрыто чешуйчатой кожей, как у обычных ящериц, и заканчивалось утолщенным хвостом, напоминающим плавник.

Для передвижения в воде пресмыкающееся извивалось по-змеиному, что делало его похожим на морских угрей. Размеры отдельных хищников достигали значительной величины, а огромная пасть могла с легкостью вместить крупную добычу.

Вместо лап мозазавр довольствовался плавниками необычного вида: широкорасставленные плавники ластовидной формы, с большим числом фаланг заметно отличали морского ящера от его сухопутных предков. Благодаря клинообразному черепу морской хищник имел удивительное сходство с крокодилом и рыбой. Питались морские ящеры преимущественно рыбой, головоногими моллюсками, морскими черепаками и аммонитами.